

Wartość odżywcza 100 ml		
Wartość energetyczna	635 kJ/ 151 kcal	Witamina B12 0,70 µg
Tłuszcz (32 En%)	5,3 g	Biotyna 7,5 µg
W tym:		Witamina C 19 mg
- kwasy nasycone	0,6 g	Składniki mineralne i pierwiastki śladowe:
- kwasy jednonienasycone	3,2 g	Sód 50 mg
- kwasy wielonienasycone	1,5 g	Potas 200 mg
Węglowodany (41 En%)	15,6 g	Chlorek 83 mg
W tym:		Wapń 280 mg
- cukry	9,7 g	Fosfor 195 mg
- izomaltuloza	5,6 g	Magnez 40 mg
- laktoza	3,4 g	Żelazo 2,1 mg
- polisacharydy	5,5 g	Cynk 1,6 mg
Błonnik (1 En%)	0,7 g	Miedź 0,34 mg
Białko (26 En%)	9,8 g	Mangan 0,63 mg
Sól	0,12 g	Fluorek 0,19 mg
Witaminy:		Molibden 19 µg
Witamina A	188 µg	Selen 11 µg
Witamina D	1,3 µg	Chrom 13 µg
Witamina E	2,3 mg (α-TE)	Jod 25 µg
Witamina K	10 µg	Inne:
Tiamina	0,28 mg	Cholina 69 mg
Ryboflawina	0,31 mg	Osmolarność 530 mOsmol/l
Niacyna	1,0 mg (3,4 mg NE)	
Kwas pantotenowy	0,33 mg	Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat. Nie stosować u pacjentów wymagających diety bezreszkowej, pacjentów z galaktozemią lub fruktozemią. Zaleca się rozpoczęcie stosowania produktu od spożycia połowy butelki, monitorując poziom glukozy we krwi. Może zaistnieć potrzeba modyfikacji schematu stosowania preparatu. Zawartość potasu i fosforu powinna być uwzględniona w całkowitej diecie pacjentów z niewydolnością nerek.
Kwas foliowy	50 µg	

PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą u pacjentów z cukrzycą i pacjentów z hiperglikemią. Zawiera cukry i substancje słodzące. Nutridrink Diasip jest produktem wysokobiałkowym, wysokoenergetycznym, zawierającym błonnik. Produkt bezglutenowy. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Produkt poddany obróbce UHT.

Najlepiej spożyć przed: na górze opakowania.

Sposób użycia: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Pić powoli. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin.

Zalecane stosowanie: 1-2 butelki na dobę jako uzupełnienie diety.

Składniki: białka mleka krowiego, woda, maltodekstryna, izomaltuloza*, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), galaktooligosacharydy (z cukru mlecznego z mleka krowiego), aromat, emulgator (lecytyna (lecytyna sojowa)), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (karmin), cytrynian potasu, chlorek cholin, wodorotlenek magnezu, L-askorbinian sodu, wodorotlenek potasu, cytrynian sodu, mleczan żelaza (II), octan DL-alfa-tokoferolu, nikotynamid, substancja słodząca (acesulfam K), octan retinylu, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, selenian(IV) sodu, siarczan cynku, chlorek chromu (III), D-pantotenian wapnia, D-biotyna, substancja słodząca (sól sodowa sacharyny), cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorowodorek tiaminy, molibdenian(VI) sodu, fluorek sodu, jodek potasu, ryboflawina, fitomenadion.

*Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.



4 x 200 ml e = 800 ml

NUTRICIA
Nutridrink®
Diasip

o smaku truskawkowym

4 x 200 ml e = 800 ml



Wyprodukowano przez:
N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandia.
Nutricia Polska Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Serwis Konsumencki:
tel.: 22 55 00 155
e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl
www.posilkiwchorobie.pl

4 x 200 ml e = 800 ml



NUTRICIA
Nutridrink®
Diasip

o smaku truskawkowym

4 x 200 ml e = 800 ml

NUTRICIA
Nutridrink®
Diasip

ODŻYWIWA

DLA NIEDOŻYWIANYCH
PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

GLIKEMICZNY
INDEKS
NISKI

DUŻA ILOŚĆ ENERGII

DUŻA ILOŚĆ BIAŁKA

WITAMINY I MINERAŁY

o smaku truskawkowym